

История пациента

Пример операции пациента с ожирением

“После операции я перестала употреблять лекарства от диабета, содержащие инсулин, и теперь чувствую себя намного комфортнее”



Сразу после операции



2 года после операции

Каждая сестра иммигрировала в Парагвай и Бразилию, в то время когда они еще учились в средней школе, и имели избыточный вес (37кг / м2) и получали лечение от диабета и артрита в течение длительного времени. Они искали способы лечения и выбрали медицинский клиник Сунчонхян. Они посетили Корею в 2012 году, где была проведена операция профессором Йонгджин Ким.

Процесс

От въезда в Корею, до возвращения на родину!

ДЕНЬ-1

Въезд и Госпитализация

Предварительная подача результатов обследования, сделанных в течение последних 6 месяцев до въезда в Корею

ДЕНЬ-2

Осмотр перед операцией

Предоперационная подготовка для общего наркоза: анализ крови, рентген, эзофагогастродуоденоскопия

ДЕНЬ-3

Операция

В целом, операция занимает 1-1,5 часа. Реабилитация и наблюдение в послеоперационной палате

ДЕНЬ-14

Возвращение домой

Повторные осмотры профессором по прибытию в Корею, и последующие руководства после возвращения в свою страну

ДЕНЬ-5

Рекомендации

Профессиональный диетолог и координатор дает указания по оптимальной диете и последующие руководство

ДЕНЬ-4

Восстановление

При отсутствии осложнений в послеоперационном периоде, прием пищи возможен в тот же день.

Часто задаваемые вопросы

Вопросы и ответы при избыточном весе

① Могу ли я сделать операцию?

Операция доступна не для всех, для начала нужно соответствовать категории оперируемых.

② Не опасна ли операция ?

Каждая операция переносится по-разному, имеются сопутствующие заболевания, сопровождающиеся осложнениями. Эта операция безопасна для пациентов с избыточным весом без сопутствующих заболеваний.

③ Сколько остается шрамов ?

Все виды операции проводятся не с помощью лапаротомии, а с помощью лапароскопии. Операция осуществляется путем проделывания 5 отверстий на передней брюшной полости с использованием эндоскопа.

④ На сколько снижается вес после операции?

70-80% от первичного веса по соотношению к идеальному, в среднем уменьшается через 1 год. Например, если текущий вес 100кг а целевой вес 60кг, 30-40 кг уменьшается за 1 год после операции.

⑤ Увеличится ли желудок после резекции?

Желудок должен отрасти после операции. Конечно, это не приводит к его увеличению до исходного размера. При обычном режиме жизни и питания, должна появится привычка есть понемногу, в связи с чем, желудок не будет растягивается.

SCH

Отдел международного медицинского сотрудничества

Адрес #59, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul, South Korea, 140-743

Веб сайт <http://www.schmc.ac.kr/seoul>

SCH

Русский координатор международного отдела

Тел. +82 2 710 3008, 3009

Skype medpage1

Моб. +82 10 7400 0749

Факс +82 2 710 3010

E-mail globalsch.ru@schmc.ac.kr

Медицинский центр
Сунчонхян

Центр Бариатрической Хирургии

Операция по ожирению,
которая улучшает
эффективность жизни

Не последний вариант,
но лучший вариант лечения

Само-Диспансеризация

Кто является субъектом?

В случае пациентов из западных стран, 40 или более и 35 ~ 40 с сопутствующими симптомами является критерием чрезмерного ожирения. В случае пациентов из азиатских стран, критериями являются 37 или более и 32 ~ 37 сопровождающейся с другим симптомом.

Каков уровень моего ожирения?

Индекс массы тела, кг / м²

Критерии ожирения очень субъективные, индекс массы тела, что рассчитывается по весу и росту является, обычно, наиболее используемый критерий для измерения ожирения

< Вы можете измерить уровень Вашего ожирения в соответствии с приведенной ниже таблицей >

Низкий вес	Нормальный вес	Избыточный вес	Ожирение 1 этап	Ожирение 3 этап	Чрезмерное ожирение
18,5 или ниже	18,5~22,9	23~24,9	25~29,9	30~35,9	35 или выше

Рост(м)	1,47	1,52	1,57	1,63	1,68	1,73	1,78	1,83	1,88	1,93	1,98
65	30,1	28,1	26,4	24,5	23,0	21,7	20,5	19,4	18,4	17,5	16,6
68	31,5	29,4	27,6	25,6	24,1	22,7	21,5	20,3	19,2	18,3	17,3
71	32,9	30,7	28,9	26,7	25,2	23,7	22,4	21,2	20,1	19,1	18,1
74	34,2	32,0	30,0	27,9	26,2	24,7	23,4	22,1	20,9	19,9	18,9
77	35,6	33,3	31,2	29,0	27,3	25,7	24,3	23,0	21,8	20,7	19,6
80	37,0	34,6	32,5	30,1	28,3	26,7	25,2	23,9	22,6	21,5	20,4
83	38,4	35,9	33,7	31,2	29,4	27,7	26,2	24,8	23,5	22,3	21,2
86	39,8	37,2	34,9	32,4	30,5	28,7	27,1	25,7	24,3	23,1	21,9
89	41,2	38,5	36,1	33,5	31,5	29,7	28,1	26,6	25,2	23,9	22,7
92	42,6	39,8	37,3	34,6	32,6	30,7	29,0	27,5	26,0	24,7	23,5
95	44,0	41,1	38,5	35,8	33,7	31,7	30,0	28,4	26,9	25,5	24,2
99	45,8	42,8	40,2	37,3	35,1	33,1	31,2	29,6	28,0	26,6	25,3
102	47,2	44,1	41,1	38,4	36,1	34,1	32,2	30,5	28,9	27,4	26,0
105	48,6	45,4	42,6	39,5	37,2	35,1	33,1	31,4	29,7	28,2	26,8
108	50,0	46,7	43,8	40,6	38,3	36,1	34,1	32,2	30,6	29,0	27,5
111	51,4	48,0	45,0	41,8	39,3	37,1	35,0	33,1	31,4	29,8	28,3
114	52,8	49,3	46,2	42,9	40,4	38,1	36,0	34,0	32,3	30,6	29,1
117	54,1	50,6	47,5	44,0	41,5	39,1	36,9	34,9	33,1	31,4	29,8
120	55,5	51,9	48,7	45,2	42,5	40,1	37,9	35,8	34,0	32,2	30,6
123	56,9	53,2	49,9	46,3	43,6	41,1	38,8	36,7	34,8	33,0	31,4
126	58,3	54,5	51,1	47,4	44,6	42,1	39,8	37,6	35,6	33,8	32,1
129	59,7	55,8	52,3	48,6	45,7	43,1	40,7	38,5	36,5	34,6	32,9
132	61,1	57,1	53,6	49,7	46,8	44,1	41,7	39,4	37,3	35,4	33,7
135	62,5	58,4	54,8	50,8	47,8	45,1	42,6	40,3	38,2	36,2	34,4
138	63,9	59,7	56,0	51,9	48,9	46,1	43,6	41,2	39,0	37,0	35,2
141	65,3	61,1	57,2	53,1	50,0	47,1	44,5	42,1	39,9	37,9	36,0
144	66,6	62,3	58,4	54,2	51,0	48,1	45,4	43,0	40,7	38,7	36,7

История пациента

Операция по Ожирению, которая улучшает эффективность жизни

Ожирение не является концепцией простого "Ожирения", но это ухудшает «качество жизни» и вызывает осложнения в виде сопутствующих заболеваний. Данная операция является несомненно проверенным методом для похудения и поддержания хорошего состояния на протяжении длительного срока. К болезням, которым приводит ожирение относятся диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, такие как гипертония, инсульт, рак молочной железы, злокачественные заболевания, такие как коло-ректальный рак, различные заболевания суставов, заболевания печени, нарушения сна и заболевания центральной нервной системы, связанные с депрессивным расстройством.



От риска возникновения таких заболеваний можно избавиться с помощью операции и поддержанием нормального веса. Это улучшение качества жизни и принципиального увеличения продолжительности жизни

Операция по чрезмерному ожирению, является не окончательным, но лучшим вариантом.

Скорость снижения избыточной массы тела пациентов, именно тех, кто сделал операцию по чрезмерному ожирению в центре от медицинского клиника Сунчонхян составляет 68%. Если темп сокращения избыточного веса составляет более 50%, темп возникновения метаболических синдромов, в том числе диабета и гипертензии уменьшается существенно. 95% пациентов, которые имели чрезмерное ожирения, сопровождающиеся диабетом, избавились от симптомов одышки во время сна.



▲ Жасмин, из Новой Зеландии, весила 212 кг, на момент операции. Сейчас, ее вес поддерживается на уровне 2 цифр, а также перестала принимать диabetические препараты, который она принимала до операции. Кроме того, исчезла одышка во время сна, и она наслаждается нормальной жизнью, как и другие.

Почему SCH хирургический центр ожирения?

Центр по Ожирению в Корее, признан во всем мире.



Центр бариатрической хирургии медицинского клиника Сунчонхян является лучшим центром по лечению ожирения в Корее. Хирургическое отделение профессора Йонгджин Ким, является ведущим центром, который славится во всем мире и который посещают пациенты со всего мира. Клинику посещали пациенты из Новой Зеландии, США, Парагвая, Центральной Азии и и други стран. Существует новое понятие:

‘Операции по Ожирению = медицинский клиник Сунчонхян.’

Профессор Йонгджин Ким, сделал около 800 операций. Он непрерывно проверяет здоровье пациентов, через систему контроля состояния пациентов.

Много дисциплинированная Система Лечения

Медицинский клиник Сунчонхян, применяет много дисциплинарную систему лечения, что обеспечивает оптимальное лечение пациентов, построенную на сотрудничестве между профессиональными членами медицинской бригады, принимая во внимание характеристики симптома.

Кафедра внутренних болезней	медицинская система специалистов, по стабильной администрации до и после операции : специалисты кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии
Кафедра анестезиологии	специалист по анестезии при чрезмерном ожирении
Департамент Красота Хирургия	специалист для анестезиологического обеспечения после операции
Команда по питанию	профессиональные медсестры и диетологи после регулярной и стабильной операции.
Координатор	соответствующие упражнения после операции и различные программы поддержки пациентов.

Виды операций

Тип операции и ее характеристики

Операции по чрезмерному ожирению подразделяются на 3 основные категории. ① Вертикальная рукавная резекция желудка ② Обходной анастомоз желудка по Ру ③ Замена двенадцатиперстной кишки. Метод, действие и достоинство каждой операции указано в таблице ниже. Пациент должен начать принимать пищу в соответствии с инструкцией контроля веса, питания и состояния здоровья врача после операции. Кроме того, пациент должен посетить больницу, для контроля веса, питания и состояния здоровья. Самое главное, это рформирование правильного пищевого рациона и занятия спортом.

Виды операций	Обходной анастомоз желудка по Ру	Замена двенадцатиперстной кишки.	
Объект	· Переедание, питание на углеводах	· Диетические привычки основаны на и жидкой пище с высоким содержанием жирного мяса · Пациент с слишком серьезным ожирением	· Пациент с чрезмерным ожирением, сопровождающиеся диабетом
Определение	· Уменьшение желудка методом удаления части желудка	· Ограничение поглощение пищи путем разделения пищевого тракта.	· Ограничение поглощение пищи, предотвращение смешивание пищеварительных соков
Эффект	· Снижение употребления большого количества пищи за 1 раз, снижение аппетита, чувство сытости.	· существенное уменьшение веса из-за малого упртребления еды, эффективен длительный период.	· Эффективен для снижения веса, так как количество диет уменьшается
Достоинства	· Осложнений меньше, пациент ест меньше чем раньше. сокращение избыточного веса на 60%	· Сокращение избыточной массы тела на 70% (очень эффективный способ для снижения веса)	· Меньше осложнений, связанных с питанием дает избавиться от сопутствующих заболеваний
Рисунок			

Послеоперационный уход

Новые жизненные привычки после операции



1. Диета
После операции для стабильного снижения веса рекомендовано поддерживаться диеты.



2. Упражнение
Диета очень важна для снижения веса, но самое главное физическая активность для стабильного снижения веса.



3. Контрацепция и беременность
Если вы имеете уже ребенка, снижение вашего веса благоприятно скажется на дальнейшем качестве жизни. Если вы еще не имеете детей, то возможность забеременеть будет тяжелее с избыточным весом.



4. Регулярный осмотр
Амбулаторное посещение осуществляется между 1 ~ 2 неделю после операции, и амбулаторное лечение проводят после 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции. Нужно проходить контроль анализа крови при каждом амбулаторном приеме. После того, как снижение веса стабилизируется, пациент должен посещать больницу один раз в год.